

Es la administración intencionada de medicamentos con la finalidad de aliviar el sufrimiento físico y/o psicológico del paciente, mediante la reducción de la conciencia de manera superficial o profunda.

Clasificación

Grado de Sedación		Duración		Fármacos	
Ligera	Profunda	Reversible	Irreversible	Efecto primario	Efecto secundario

Indicaciones



Síntoma refractario no controlable

Emergencias específicas

Agitación terminal

Convulsiones

Sofocación

Hemorragia masiva

Tratamiento



Delirium Terminal

Benzodiacepina:

Midazolam,
Diazepam

Antipsicóticos:

Haloperidol,
Levomepromazina

Sin respuesta a dosis altas usar
Barbitúricos:
Fenobarbital.

Convulsiones

Benzodiacepina: Midazolam,
Diazepam

Neurolépticos:

Levomepromazina,
Clorpromazina

En caso de ilusiones, alucinaciones o agitación paradójica utilizar anestésicos: Propofol.

Recomendaciones

- ✓ Individualizar la decisión terapéutica de cada paciente
- ✓ Respetar la decisión del paciente y su familia
- ✓ Solicitar el consentimiento informado explícito, implícito o delegado del paciente y anexarlo al expediente clínico.
- ✓ No suprimir los cuidados elementales (higiene y confort).
- ✓ No suspender la medicación elemental para controlar la sintomatología.
- ✓ Omitir o suspender tratamientos médicos que no brinden alivio y que no afecten el pronóstico del enfermo.
- ✓ Plantear la **SEDACIÓN** como **ULTIMA** medida de control de síntomas.