

SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA

La sedación de los pacientes al final de la vida es una herramienta terapéutica potencialmente muy útil en Medicina Paliativa. Desde el punto de vista médico, su indicación se reserva para el manejo de síntomas severos y refractarios.

CRITERIOS ÉTICOS

- Si existe una diferencia éticamente relevante entre la sedación paliativa y la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.
- la sedación paliativa puede ser éticamente apropiada para pacientes que no están en etapa de muerte inminente.
- Todo paciente tiene derecho a un muerte digno sin sufrimiento y dolor
- Se debe tener el consentimiento informado para proceder a una sedación
- Principio de autonomía

SELECCIÓN DE FARMACOS

- Elegir apropiadamente el agente para iniciar la sedación considerando los síntomas presentados
- Motorizar el nivel de sedación utilizando escalas específicas
- Administrar dosis adicionales en caso de ser necesario

DECISIONES ÉTICAS AL FINAL DE LA VIDA



INDICACIONES

- Dolor
- Delirio
- Agitación
- Disnea
- Cáncer
- Enfermedad terminal



RECOMENDACIONES

- Respetar la decisión del paciente y su familia
- No suprimir los cuidados elementales de higiene y confort ni la medicación elemental

