

1. Utiliza el formato proporcionado en Powerpoint que tiene la medida del gafete (10 x 6 cm).
2. El gafete incluye:
 - Título
 - Texto que sintetiza la información
 - Al menos 3 elementos gráficos como: formas, flechas, líneas, iconografía, colores, tipografías, etc.
 - Nombre del autor
3. Conserva el logotipo del curso ya incluido en el formato.
4. La distribución y proporción del contenido se adecúa a la medida del gafete y se visualiza claramente.
5. Entrega a tiempo el gafete en la Biblioteca de Urgencias Médicas según la categoría o tema correspondiente.



SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA



Elaboro: Felipe Gómez Jaimes

Administración intencionada de medicamentos con la finalidad de aliviar el sufrimiento físico y psicológico, que es inalcanzable con otras medidas, con el previo consentimiento del paciente.



Clasificación

Poca duración:

reversible-irreversible

Grado de sedación:

Ligera-profunda

Fármacos que la inducen:

Efecto primario y secundario

Indicaciones

1. Delirium hiperactivo
2. convulsiones (status epilepticus)
3. Sofocación
4. Hemorragia masiva

Medicamentos

Agitación severa : benzodiazepinas/antipsicóticos
Convulsiones: benzodiazepinas /neurolepticos
Delirium terminal: barbitúico
Agitación paradójica: anestésicos

