

Status epilepticus (SE)

Causas




Persistencia de actividad cerebral descontrolada durante 30 minutos o más, ó dos o más crisis sin recuperación total de la conciencia entre ellas (*Epilepsy Foundation of America*)



SÍNTOMAS

- Alteración del estado de conciencia o incluso su pérdida
- Convulsiones (Contracción y distensión repetida y temblorosa de uno o varios músculos del cuerpo)
- Alucinaciones simples, zumbidos, palidez, sudoración, enrojecimiento facial, dilatación pupilar, distorsión del tiempo, miedo, temor e ira.



Tratamiento farmacológico y cuidado.

- ✓ Inicial: Tiamina, Diazepán, Fenitoína sódica, Valproato.
- ✓ Ante la falta de respuesta: Tiopental, Fenobarbital, Pentobarbital, Propofol y Midazolam.
- ✓ Vigilancia de la presión arterial y oxigenación.
- ✓ Colocar la cabeza sobre una almohada para prevenir aspiración en caso de vómitos Post Crisis
- ✓ Lateralizar una vez cese una crisis convulsiva intensa y colocar la cabeza sobre una almohada para prevenir aspiración en caso de vómitos Post Crisis Convulsiva
- ✓ No reprimir los movimientos convulsivos, en forma enérgica.

Cuidados Paliativos

INGER Curso