

SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA

Administración intencionada de medicamentos (en las dosis y combinaciones necesarias) con el fin de reducir la consciencia superficial o profunda, de forma transitoria o permanente con la intención de aliviar el sufrimiento físico y/o psicológico, explícito o delegado del paciente.

LA SEDACIÓN ES LA ÚLTIMA MEDIDA DE CONTROL DE SÍNTOMAS

INDICACIONES:

- ✓ Síntoma refractario que no sea controlable
- ✓ Emergencias específicas
 - ✓ Delirium hiperactivo refractario al tratamiento (agitación terminal)
 - ✓ Convulsiones (Status epilepticus)
 - ✓ Sofocación
 - ✓ Hemorragia masiva con



Tratamiento: compromiso vital inmediato

- ✓ Benzodiazepinas
 - ✓ Midazolam
 - ✓ Diazepam
- ✓ Antipsicóticos
 - ✓ Haloperidol
 - ✓ Levomepromazina
- ✓ Neurolépticos
 - ✓ Cloropromazina
- ✓ Barbitúrico
 - ✓ Fenobarbital
- ✓ Anestésicos
 - ✓ Propofol



Cuidados Paliativos
INGER Curso

Dra. Silvia del C Chavira E

1. Utiliza el formato proporcionado en Powerpoint que tiene la medida del gafete (10 x 6 cm).
2. El gafete incluye:
 - Título
 - Texto que sintetiza la información
 - Al menos 3 elementos gráficos como: formas, flechas, líneas, iconografía, colores, tipografías, etc.
 - Nombre del autor
3. Conserva el logotipo del curso ya incluido en el formato.
4. La distribución y proporción del contenido se adecúa a la medida del gafete y se visualiza claramente.
5. Entrega a tiempo el gafete en la Biblioteca de Urgencias Médicas según la categoría o tema correspondiente.

