

Identification of Seniors at Risk - Hospitalized Patients (ISAR-HP)

Identificación de personas mayores hospitalizadas en riesgo		
Ítems, antes de la admisión hospitalaria.	Sí	No
¿Necesitaba regularmente ayuda para alguna de las actividades instrumentales de la vida diaria (uso de transporte, uso de teléfono, manejo de medicación, manejo de dinero, hacer compras, preparar alimentos, labores del hogar o lavar ropa)?	1	0
¿Necesitaba algún auxiliar para deambular (bastón, andadera, muletas)?	2	0
¿Necesitaba ayuda para salir de viaje?	1	0
¿Continuó su educación después de los 14 años de edad?	0	1
Puntaje: 0-1. Riesgo bajo Puntaje: 2-3. Riesgo intermedio Puntaje: 4-5. Riesgo alto		
Fuente: Adaptado de Asmus-Szepesi KJ, et al. (2013). Prognosis of hospitalised older people with different levels of functioning: a prospective cohort study. <i>Age & Ageing</i> . 42(6):803.		

Este instrumento permite detectar el riesgo de deterioro funcional durante la hospitalización, a los tres y a los 12 meses después del egreso hospitalario. Tiene un valor predictivo positivo de 43% y un valor predictivo negativo de 85%. Su uso es parte de las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica: Intervenciones de rehabilitación temprana en el adulto mayor hospitalizado (Secretaría de Salud, 2013).